

Glucose tolerance test in
pregnancy

The Dudley Group **NHS**
NHS Foundation Trust

حمل ميں گلوکوز کے برداشت کی جانچ

شعبہ زچگی
مریض کا معلوماتی پرچہ



Accredited as
Baby Friendly by

unicef 

گلوکوز کے برداشت کی جانچ (GTT) کیا ہے؟

یہ ایک سادہ سی جانچ ہے جسے حمل کے دوران یہ معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آیا آپ کو ایام حمل کا ذیابیطس ہے۔

ایام حمل کا ذیابیطس کیا ہے؟

یہ عام طور پر ذیابیطس کی عارضی شکل ہے جس میں آپ کے خون میں گلوکوز کی سطحیں زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور پر کھانے کے بعد، اور یہ حمل کے دوران عورتوں کو متاثر کرتا ہے۔

عام طور پر، خون میں گلوکوز کی مقدار پر انسولین نامی ہارمون کے ذریعہ قابو پایا جاتا ہے۔ البتہ، حمل کے دوران، بعض خواتین کے خون میں گلوکوز کی سطحیں معمول سے کافی زیادہ ہوجاتی ہیں جس پر انسولین قابو نہیں رکھ پاتا۔

ایام حمل کا ذیابیطس عام طور پر تیسری سہ ماہی (28 ہفتوں بعد) ہوتا ہے اور عام طور پر بچے کی ولادت کے بعد ختم ہوتا ہے۔ البتہ، جن عورتوں کو ایام حمل کا ذیابیطس ہوتا ہے انہیں زندگی کے بعد کے دور میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔

یہ ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آیا آپ کو ایام حمل کا ذیابیطس ہے کیونکہ اس سے آپ اور آپ بچے کی نگرانی کے لیے مزید قبل از ولادت اپائنٹمنٹس کی ضرورت ہوگی۔ ایسا اس لیے ہے کہ اگر آپ کو یہ ہے تو، آپ کو حمل اور ولادت کے دوران پیچیدگیاں ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، خاص طور پر اگر ذیابیطس کا علاج نہیں ہوتا ہے۔

کسے ایام حمل کا ذیابیطس ہوتا ہے؟

آپ کو ایام حمل کے ذیابیطس میں مبتلا ہونے کا اعلیٰ ترین خطرہ ہے اگر:

- آپ کو سابقہ حمل کے دوران ایام حمل کا ذیابیطس ہوا ہو۔
- آپ کے کسی قریبی رشتہ دار (والدین، بھائی، بہن، بچے) کو ذیابیطس ہو۔
- آپ کو پچھلے حمل میں زیادہ بڑا بچہ ہوا ہو، 4.5 کلوگرام سے زیادہ۔
- آپ کو پچھلے حمل میں بغیر کسی وجہ کے مردہ بچے کی ولادت ہوئی ہو۔
- آپ کا جسمانی کمیت کا اشاریہ (بی ایم آئی) 30 سے زیادہ ہو۔
- آپ کے حمل کے دوران آپ کے پیشاب میں شکر (گلوکوز) آتا ہو۔

- آپ کے خاندان کی اصل جنوب ایشیائی (خاص طور پر ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش)، سیاہ فام کیریبیائی یا مشرق وسطیٰ (خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، اردن، ملک شام، عمان، قطر، کویت، لبنان یا مصر) ہو۔

اس کی کیا علامات ہیں؟

اکثر ایام حمل کے ذیابیطس کی کوئی علامات نہیں ہوتیں۔ اسی وجہ سے، آپ کو حمل کے دوران کے پہلے اپائٹمنٹ پر خون کی جانچ کروانے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔

اگر آپ کو دوران حمل کے ذیابیطس کا بڑھا ہوا خطرہ ہے تو، آپ کو ایک GTT ٹیسٹ پیش کیا جائے گا جو کہ حمل کے ہفتہ 26 تا 28 میں انجام دیا جاتا ہے۔ البتہ، اگر آپ پچھلے حمل میں ایام حمل کے ذیابیطس میں مبتلا رہی ہیں تو، یہ ٹیسٹ حمل کے 16 سے 18 ہفتوں میں انجام دیا جائے گا۔

خون میں زیادہ گلوکوز بعض علامات پیدا کرسکتا ہے بشمول:

- منہ خشک ہونے کے ساتھ پیاس میں اضافہ
- اکثر پیشاب کرنے کی حاجت، خاص طور پر رات میں
- تھکان
- اعادی انفیکشنز، جیسے کہ جوشش دہن (ایک خمیری انفیکشن)
- دھندلی بینائی

اس ٹیسٹ میں کیا شامل ہے؟

- ٹیسٹ سے پہلے کی رات، یہ ضروری ہے کہ آپ رات 10 بجے کے بعد سے کچھ نہ کھائیں۔ آپ پانی کے گھونٹ لے سکتی ہیں۔
- جب آپ کلینک پہنچیں گی تو، ہم آپ کے خون کا ایک نمونہ لیں گے۔
- پھر آپ کو پانچ تا چھ منٹوں میں ایک گلوکوز والا مشروب پینا ہوگا۔
- اس کے بعد، آپ کو دو گھنٹوں تک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھنا ہوگا۔ اس وقت کے دوران آپ نہ تو کھائیں، نہ ہی کچھ پئیں گی یا سگریٹ نوشی کریں گی۔ بہتر ہے کہ کوئی رسالہ، کتاب یا کرنے کے لیے کچھ لے کر آئیں، اور ٹیسٹ کے بعد کے لیے اسنیک بھی ساتھ لائیں۔
- دو گھنٹوں بعد، ہم خون کا دوسرا ٹیسٹ لیں گے۔ پھر یہ ٹیسٹ مکمل ہوجائے گا اور آپ گھر جاسکتی ہیں۔

براہ کرم ٹیسٹ کے لیے آتے وقت اپنا دستی گرین نوٹس ساتھ لائیں۔

میں ٹیسٹ کیسے بُک کروں؟

آپ کی کمیونٹی مڈوائف یا ایام حمل کے کلینک کا عملہ آپ کو ٹیسٹ بُک کرنے کا طریقہ بتائے گا۔

ٹیسٹ کہاں انجام دیا جاتا ہے؟

یہ درج ذیل مقامات میں سے کسی ایک پر ہوگا:

- برائرسونٹ، برائری ہل ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر سنٹر، وینچر وے، برائری ہل، DY5 1RU (بالمقابل اسدا کار پارک)
- لیڈیز واک کلینک، پرائری لین، ڈڈلے DY3 3UD -

براہ کرم یہ معلوم کرنا یقینی بنائیں کہ آپ کا ٹیسٹ کہاں ہو رہا ہے۔

میں نتائج کیسے حاصل کروں گی؟

آپ کے ٹیسٹ کے نتائج کا جائزہ دو کاروباری دنوں کے اندر لیا جائے گا۔ اگر نتیجہ نارمل رہتا ہے تو، مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور آپ کی کمیونٹی مڈوائف کو نتیجے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ وہ آپ کو نتائج سے آگاہ کرے گی۔

اگر نتیجہ غیر معمولی رہتا ہے تو، ہم آپ کو ایک مشترکہ دوران حمل/ذیابیطس سے متعلق کلینک بھیجیں گے اور وہ آپ کے معائنے کا انتظام کریں گے۔

ایام حمل کے ذیابیطس کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟

اگر آپ کو ایام حمل کا ذیابیطس ہے تو، جب آپ کو دوران حمل/ذیابیطس سے متعلق کلینک بھیجا جاتا ہے تو آپ کو آپ کے خون میں گلوکوز (شکر) کی سطحوں کی نگرانی اور اس پر قابو پانے کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔

کبھی کبھی، غذا میں تبدیلی اور زیادہ ورزش آپ کے ایام حمل کے ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے کافی ہوں گے۔ بعض خواتین کو دوا کی ضرورت ہوسکتی ہے۔

آپ کو زیادہ کثرت سے ایام حمل کے اپائنٹمنٹس پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ اور آپ کے نامولود بچے کی قریبی نگرانی ہوسکے۔

اگر آپ کو اپنے ٹیسٹ کے دوبارہ انتظام کی ضرورت ہو تو، براہ کرم 01384 244312 پر کال کریں۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، یا اگر اس کتابچے کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو، براہ کرم رابطہ کریں:

پریگنسی ڈے اسسمنٹ یونٹ سے 01384 244312 یا اپنی کمیونٹی مڈوائف سے (صبح 9 تا 5 بجے، پیر تا جمعہ)

اس کتابچے کو اس پتے سے ڈاؤن لوڈ یا پرنٹ کیا جاسکتا ہے:

<http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/maternity/>

This leaflet can be made available in large print, audio version and in other languages, please call 0800 0730510

ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ (ਛੋਟਾ ਇਸਤਿਹਾਰ) ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੁੱਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ਟ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ 0800 0730510 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

यदि आपको यह दस्तावेज़ अपनी भाषा में चाहिए तो पेशन्ट इनफरमेशन को-आरडीनेटर को टेलीफोन नम्बर 0800 0730510 पर फोन करें।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟੀ ਵਾਕਾ (ਪੁਸ਼ਤਾਤੀ)ਮਾਂ ਖੋਠਿੰਦੀ ਡੀਖ, ਤੋ ਡੁਖਾ ਕਰੀਨੇ ਪੇਸ਼ਨਟ ਈ-ਓਰਡੀਨੇਟਰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ 0800 0730510 ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

आपनि यदि এই প্রচারপত্রটি আপনার নিজের ভাষায় পোতে চান, তাহলে দয়া করে পেশেন্ট ইনফরমেশন কো-অর্ডিনেটরের সাথে 0800 0730510 এই নম্বরে যোগাযোগ করুন।

إذا كنت ترغب هذه الورقة مترجمة بلغتك الأصلية (اللغة العربية) , فرجاء اتصل بمنسق المعلومات للمريض
Information Co-ordinator على التلفون 0800 0730510

حسب ضرورت اس لیفٹ کو اپنی زبان (اردو) میں حاصل کرنے کے لیے برہم پرائی ٹیلیفون نمبر 0800 0730510 پر وقت (پنجشنبہ-ہفت روزہ) میں ممبروں کے لیے معلومات کی فراہمی کے سلسلے میں (شرکے کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔